	FICHA TECNICA	CODIGO: FT-DT-001	
	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% x 4 L	Fecha Emisión:	18/03/20
		Fecha Revisión:	18/03/23
	Dirección Técnica	Ver : 01	
Página 1 de 2			

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% x 4 L	REGISTRO SANITARIO 2020M-0019543	Código Producto 7707233060018
Titular y fabricante: NEOPHARMA DE COLOMBIA S.A.S.		
Compuesto Activo:	Alcohol Etílico	
Modalidad del Registro Sanitario:	Fabricar y vender	
Forma Farmacéutica:	Solución uso tópico	
Vida útil:	2 años	
Condición de venta:	Venta sin fórmula médica	

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

ENSAYO	ESPECIFICACION
DESCRIPCIÓN:	Líquido traslucido, incoloro, libre de partículas extrañas.
pH	4,5 – 6,6
Gravedad Especifica:	0,8812 – 0,8887
Valoración de Alcohol:	68,5% - 71,5% (V/V)

MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ENSAYO	ESPECIFICACION
Empaque primario	GALON PET x 4 L GALON PEAD x 4 L
Empaque secundario	Etiqueta adhesiva

VIA ADMINISTRACION


Tópica Externa.

INDICACIONES

Antiséptico de uso externo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al alcohol etílico o a cualquiera de los excipientes.

	FICHA TECNICA	CODIGO: FT-DT-001	
	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% x 4 L	Fecha Emisión:	18/03/20
		Fecha Revisión:	18/03/23
	Dirección Técnica	Ver : 01	
		Página 2 de 2	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Sólo para uso externo. Es una solución fácilmente inflamable. Se recomienda mantener el recipiente bien cerrado y protegido del calor y de fuentes de ignición. No fumar durante su aplicación. No poner en contacto con las mucosas, debido a que es muy irritante. El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel. Puede producir dermatitis de contacto. En caso de ingestión, se debe buscar atención médica inmediata. No se recomienda aplicar sobre heridas profundas y extensas. No aplicar sobre heridas, porque irrita el tejido dañado y puede formar un coagulo que protege a las bacterias resistentes. Evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produce contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario.

DOSIFICACION Y GRUPO ETARIO

Aplicar directamente sobre el área. Dejar actuar dos minutos antes de cualquier procedimiento. Población pediátrica, no existen datos disponibles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños.